

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

BULLETIN TECHNIQUE des STATIONS d'AVERTISSEMENTS AGRICOLES

ÉDITION DE LA STATION RHONE-ALPES

(AIN, ARDÈCHE, DROME, ISÈRE, LOIRE, RHONE, SAVOIE, HAUTE-SAVOIE)

SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

ABONNEMENT ANNUEL: 60 F

55, rue Mazenod - 69426 LYON CEDEX 3
Tél. (78) 62.20.30 (Postes 426 et 427)

Répondeur : (78) 60.17.74

C.C.P. LYON 9431-17 A
Régisseur Avances et Recettes D. D. A.
55, rue Mazenod - 69426 LYON CEDEX 3

Lisez sur l'enveloppe de ce bulletin le numéro de votre région

V I G N E
=====

Dégâts de la SECHERESSE. - Par suite de la mauvaise répartition des pluies au cours de la saison, quelques fortes précipitations séparées par de longues périodes sèches, on observe fréquemment les symptômes classiques de la sécheresse : rougissement puis dessèchement du bord du limbe gagnant les espaces entre les nervures, principalement sur les feuilles les plus anciennes. Ces troubles ne semblent avoir que très rarement une incidence sur la récolte non plus que les petites ponctuations noires dues soit à une pollution, soit à des attaques antérieures d'acariens, et entre lesquelles les tissus restent parfaitement verts.

ARBRES FRUITIERS
=====

DEPERISSEMENT BACTERIEN du PECHER. - Afin de couvrir le tout début de la chute des feuilles et protéger ainsi les premières plaies pétioles, il est indispensable, dans les régions contaminées par la maladie (parties des départements : Ardèche, Drôme, Isère, Loire et Rhône), de réaliser un traitement dès réception dans les zones qui ont le plus souffert de la sécheresse, dès la chute des premières feuilles dans les autres cas.

Traiter par beau temps et sur un feuillage sec à l'aide d'un produit cuprique, à la dose de 125 gr/hl de cuivre métal. Par la suite et jusqu'à la chute totale du feuillage on répétera ces applications à intervalles variables suivant l'importance des précipitations mais n'excédant jamais 12 jours.

PSYLLE du POIRIER. - Les éclosions de larves sont en cours mais dans un nombre limité de plantations mais, même dans ces situations, la faible densité des populations autorise à différer sans risque les traitements tardifs. On surveillera toutefois l'évolution de ces populations afin d'intervenir si elles atteignent un niveau critique.

GRANDE CULTURE
=====

ALTISE du COLZA. - En complément aux conseils du bulletin précédent, nous signalons que le traitement du sol au CARBOFURAN (CURATER) constitue une bonne protection contre les altises. Il doit être utilisé en localisation dans la raie de semis, à l'aide d'un épandeur de granulés de préférence, à raison de 600 gr/hectare de produit pur (12 kg/hectare de produit commercial).

L'Ingénieur en Chef d'Agronomie,
Chef de la circonscription phytosanitaire
"Rhône-Alpes",

R. GIREAU.

Imprimerie de la Station Rhône-Alpes - le Directeur-Gérant : P. JOURNET.
Inscription à la C.P.P.A.P. N° 477 AD.

P 322